

Exercices

Groupes monogènes, cycliques, abéliens finis

Exercice 1 Le groupe \mathbb{Z}^2 est-il monogène? Même question pour H sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$ engendré par une partie finie.

Exercice 2 Pour p premier, on note \mathbb{F}_p le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Trouver un générateur des groupes multiplicatifs \mathbb{F}_7^\times , \mathbb{F}_{11}^\times et \mathbb{F}_{17}^\times .

Exercice 3 Soient g élément d'ordre n d'un groupe G et $k \in \mathbb{Z}$.

a) Quel est l'ordre de g^k ? Quels sont tous les générateurs de $\langle g \rangle$? Déterminer le groupe $\Gamma = \text{Aut}(\langle g \rangle)$. Montrer que $\Gamma \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

b) On suppose que $G = \langle g \rangle$. Montrer que tout sous-groupe de G est cyclique, et que pour tout $d|n$ G a un unique sous-groupe d'ordre d .

c) On prend $G = \mathbb{F}_p^\times$ avec p premier impair. On note $G^k = \{x^k \mid x \in G\}$. Montrer que le sous-groupe G^2 est l'ensemble des x tels que $x^{(p-1)/2} = 1$, d'indice 2 dans G . Décrire de même le sous-groupe G^3 en fonction de $p - 1$.

Exercice 4 a) À quelle condition sur a, b entiers ≥ 2 le groupe produit $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ est-il cyclique?

b) Soient d le pgcd de a et b et m leur ppcm. Factoriser le morphisme de groupes naturel de $a\mathbb{Z}$ dans $(a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z})/b\mathbb{Z}$. Quel isomorphisme obtient-on? Conclure que $ab = dm$.

Exercice 5 Donner l'ordre maximal d'un élément du groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/77\mathbb{Z})^\times$, et trouver un élément de cet ordre.

Exercice 6 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note \mathbb{U}_n le sous-groupe (cyclique!) des racines n -ièmes de l'unité dans \mathbb{C}^* . Soient m, n dans \mathbb{N}^* , et N leur ppcm.

a) Identifier le groupe $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$. Montrer que le sous-groupe $\mathbb{U}_n \cdot \mathbb{U}_m = \langle \mathbb{U}_n, \mathbb{U}_m \rangle$ est égal à \mathbb{U}_N .

b) On suppose n et m premiers entre eux. Montrer que tout générateur de \mathbb{U}_{nm} s'écrit de manière unique comme produit d'un générateur de \mathbb{U}_n et d'un générateur de \mathbb{U}_m . Qu'en déduisez-vous pour la fonction d'Euler φ ?

Exercice 7 Soit G un groupe fini dont tout élément est d'ordre 1 ou 2. Montrer que G est abélien. Montrer que la loi de G le munit naturellement d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Conclure que G est d'ordre 2^k ($k \in \mathbb{N}$), isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$.

Exercice 8 Soit G un groupe d'ordre 15. On admet (cf. exos 14,15) que G contient un élément x d'ordre 5 et un élément y d'ordre 3, et que $H = \langle x \rangle$ est distingué dans G .

Quel est le cardinal de $\text{Aut}(H)$? En déduire que tout morphisme de $\langle y \rangle$ dans $\text{Aut}(H)$ est trivial. En déduire que $xy = yx$ et que G est abélien. Conclure que G est cyclique.

Exercice 9 Montrer que le groupe symétrique S_5 n'a pas de sous-groupe d'ordre 15.

Groupes opérant sur un ensemble et géométrie

Exercice 10 Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

1. Le groupe $\text{GL}(E)$ agit naturellement sur E . Cette action est-elle transitive? Quelles sont ses orbites? Quel est le stabilisateur d'un vecteur u de E ?

2. Mêmes questions pour les actions de $\text{SL}(E)$ et de $\text{O}(E)$, si E est euclidien.

3. ANGLES Idem pour l'action de $\text{SO}(\mathbb{R}^2)$ sur l'ensemble vecteurs unitaires de \mathbb{R}^2 euclidien, puis sur l'ensemble des couples de vecteurs unitaires (action diagonale). Les orbites pour ces couples forment l'ensemble \mathcal{A} des *angles orientés* $(\widehat{u, v})$ de vecteurs unitaires du plan.

a) Définir une bijection R de l'ensemble \mathcal{A} de ces angles $(\widehat{u, v})$ sur le groupe abélien $\text{SO}(\mathbb{R}^2)$. Par transport de structure via R , ceci munit \mathcal{A} d'une loi de groupe additif.

b) Montrer la *relation de Chasles* $(\widehat{u, v}) + (\widehat{v, w}) = (\widehat{u, w})$.

c) Si u, u', v, v' sont unitaires dans \mathbb{R}^2 , montrer que $(\widehat{u, v}) = (\widehat{u', v'})$ ssi $(\widehat{u, u'}) = (\widehat{v, v'})$.

Exercice 11 Soit G un groupe fini opérant transitivement sur un ensemble fini X . On considère un point $x \in X$ et on note H son stabilisateur.

1. Pour $g \in G$, expliciter le stabilisateur du point $g \cdot x$.

2. À quelle condition sur H l'action de G est-elle fidèle?

3. Soit K un sous-groupe distingué de G . Montrer que les orbites de X pour l'action de K ont toutes même cardinal.

Donner un contre-exemple dans le cas où K n'est pas distingué.

Exercice 12 Soient \mathbb{F}_q un corps fini et n entier ≥ 1 .

1. Montrer que le groupe $\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ opère *simplement transitivement* sur l'ensemble \mathcal{B} des bases de $(\mathbb{F}_q)^n$ (cad. : pour toutes bases $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ de $(\mathbb{F}_q)^n$, il existe un unique g dans $\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ tel que $g(e_i) = e'_i$ pour tout i).

2. En déduire l'ordre du groupe $\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)$.

3. Soit d entier $\leq n$. Déterminer le nombre de sous-espaces vectoriels de $(\mathbb{F}_q)^n$ de dimension d .

Exercice 13 G -COLORIAGES

1. Soit G un groupe fini qui agit sur un ensemble X fini. Montrer la *formule de Burnside* qui donne le nombre N d'orbites pour cette action :

$$N = \frac{1}{\text{card } G} \sum_{g \in G} \text{card Fix}(g),$$

où $\text{Fix}(g)$ ($g \in G$) désigne l'ensemble des $x \in X$ tels que $g \cdot x = x$ (on pourra dénombrer de deux manières l'ensemble $E = \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}$).

Un ensemble \mathcal{C} de q couleurs étant fixé, on appelle G -coloriage de X par \mathcal{C} toute G -orbite de l'ensemble \mathcal{F} des fonctions de X dans \mathcal{C} , où on munit \mathcal{F} de l'action induite.

2. Expliciter l'action de G sur \mathcal{F} et montrer qu'une fonction f de \mathcal{F} est fixe par l'élément g de G ($g \in G$) ssi f est constante sur les $\langle g \rangle$ -orbites de X .

3. En déduire que le nombre de G -coloriages de X vaut $\frac{1}{\text{card } G} \sum_{g \in G} q^{|\langle g \rangle|}$, où pour tout g on note $|\langle g \rangle|$ le nombre de $\langle g \rangle$ -orbites de X .

Des exemples :

4. À partir de perles de couleur rouge ou bleue, combien peut-on faire de colliers de 6 perles différents ? (on identifie deux colliers à rotation et symétrie près, *ie* modulo l'action du groupe diédral D_6 , cf. exo 21.)

5. Dénombrer les coloriages possibles d'un cube, à rotation près, où chaque face est coloriée avec l'une des 3 couleurs blanche, rouge, ou bleue (voir exo 23-9).

Quelques applications à la structure des groupes finis

Exercice 14 THÉORÈME DE CAUCHY, PREUVE DE J. MCKAY

Soit G un groupe fini d'ordre multiple de p , p un nombre premier. Dans G^p , on considère la partie $S = \{(x_1, \dots, x_p) \mid x_1 \cdots x_p = 1_G\}$.

On fait agir $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ par permutation circulaire sur G^p : pour $\bar{k} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $(x_1, \dots, x_p) \in G^p$, on pose $\bar{k} \cdot (x_1, \dots, x_p) = (x_{1+k}, \dots, x_{p+k})$, où les indices sont vus modulo p : $x_{l+p} = x_l = x_{[l]}$ pour tout l , en notant $[l]$ le représentant de \bar{l} dans $\{1, \dots, p\}$.

1. Montrer que S est stable sous l'action de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Quelles sont ses orbites à 1 élément ?

2. Calculer le cardinal de S et conclure que G possède au moins un élément d'ordre p .

Exercice 15 THÉORÈME DE ORE (OU FROBENIUS)

Soient G un groupe fini, et p le plus petit nombre premier divisant le cardinal de G . On suppose que G possède un sous-groupe H d'indice p .

Montrer que H est distingué dans G (utiliser l'action de G par translation sur G/H).

THÉORÈMES DE SYLOW :

Exercice 16 Soit G un groupe fini, d'ordre $n = p^\alpha m$, où p premier ne divise pas m , et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On se propose de montrer que G possède un sous-groupe d'ordre p^α (dit " p -sous-groupe de Sylow") : c'est le *premier théorème de Sylow*.

On raisonne par récurrence sur l'ordre de G . Le théorème est clair si G est d'ordre p . On suppose dans les questions 1. et 2. que le résultat est vrai pour tout groupe d'ordre $< n$ et multiple de p . On admettra le théorème de Cauchy (voir exo 13) dans le cas où le groupe est *abélien* (la preuve dans ce cas est élémentaire, par exemple par récurrence sur l'ordre de G).

1. Si G contient un sous-groupe strict dont l'indice est premier à p , justifier que G possède un p -sous-groupe de Sylow.

2. On suppose que p divise l'indice de tous les sous-groupes stricts de G .

a) Écrire l'équation aux classes pour l'action de G par conjugaison sur lui-même, et montrer que le centre de G contient un élément x d'ordre p . Si $\alpha = 1$, $\langle x \rangle$ est un p -sous-groupe de Sylow.

b) Si $\alpha \geq 2$, justifier que $\langle x \rangle$ est distingué dans G et conclure pour G en utilisant un p -Sylow de $G/\langle x \rangle$.

3. En déduire le premier théorème de Sylow.

Exercice 17 1. Soient H, P des sous-groupes d'un groupe fini G . Soit p un diviseur premier de $\text{card}(G)$. On suppose que $\text{card}(P) = p^n$ et que $[G : H] = m$ est premier avec p .

Montrer que P est contenu dans un conjugué de H (on fera agir P par translation sur G/H).

2. En déduire que les p -sous-groupes de Sylow de G sont tous conjugués, et que tout p -sous-groupe de G est inclus dans un p -Sylow : c'est le *deuxième théorème de Sylow*.

Exercice 18 1. On note D_4 le groupe des isométries du carré de sommets $\{(\pm 1, \pm 1)\}$ de \mathbb{R}^2 euclidien (voir aussi exo 21). Montrer que D_4 agit sur l'ensemble $\{A_j | 1 \leq j \leq 4\}$ des 4 sommets. Étudier cette action et énumérer les permutations des 4 sommets obtenues.

2. Montrer que S_4 contient 3 sous-groupes isomorphes à D_4 , conjugués. Quelle est leur intersection deux à deux ? On reconnaîtra un même sous-groupe distingué de S_4 .

Exercice 19 a) Donner les types d'éléments de A_5 et le nombre d'éléments de chaque type. Étudier si deux éléments de même ordre sont conjugués dans A_5 . Pour σ 5-cycle et $k = 2, 3, 4$, étudier si σ est ou non conjugué à σ^k .

b) Soit H un sous-groupe distingué de A_5 . En remarquant que H est réunion de classes de conjugaison, montrer que H est A_5 ou $\{id\}$. Par suite le groupe A_5 est *simple* non abélien.

Groupes finis d'isométries (en dimension 2 et 3)

Exercice 20 Déterminer le groupe des isométries affines du plan qui conservent globalement la partie X suivante :

- i) la réunion des axes Ox et Oy
- ii) l'ensemble des deux points $(-1, 0)$ et $(1, 0)$
- iii) l'ensemble des quatre points $(\pm 1, 0)$ et $(\pm 1, 1)$
- iv) l'ensemble $\{(\pm 2, \pm 1)\}$ (sommets d'un rectangle)

Exercice 21 GROUPE DIÉDRAL, DES ISOMÉTRIES D'UN POLYGONE RÉGULIER ¹

On se fixe un entier $n \geq 3$. Les polygones à n côtés qui sont *réguliers* sont ceux qui admettent le plus grand groupe "de symétrie" (d'ordre $2n$, cf. 1c).

On dit qu'un groupe G est *diédral de type D_n* , s'il est engendré par deux éléments r, s tels que : r est d'ordre n , s est d'ordre 2 et $rsrs = 1_G$ (de manière équivalente, $rs = sr^{-1}$).

1. On se place dans le plan euclidien usuel, identifié à \mathbb{C} . On considère le polygone convexe régulier à n côtés \mathcal{P}_n , de sommets les $e^{2ik\pi/n}$, $0 \leq k \leq n-1$, et on définit les isométries r et s par : $\forall z \in \mathbb{C}, r(z) = e^{2i\pi/n}z, s(z) = \bar{z}$ (r est la rotation d'angle $2\pi/n$ et s est la réflexion d'axe Ox). On note G le sous-groupe $\langle r, s \rangle$ de $O(\mathbb{R}^2)$.

a) Montrer que G est diédral de type D_n .

b) Montrer que le groupe des isométries du plan euclidien qui conservent l'ensemble des sommets de \mathcal{P}_n est G (on vérifie que c'est aussi le groupe des isométries du polygone \mathcal{P}_n), et que G est d'ordre $2n$. Pour $n = 3$ et $n = 4$, dessiner \mathcal{P}_n et les axes des réflexions de son groupe d'isométries.

c) Vérifier que G agit transitivement, d'une part sur les sommets de \mathcal{P}_n , d'autre part sur l'ensemble des $2n$ couples formés d'un côté de \mathcal{P}_n et de l'un de ses deux sommets.

2. Soit $G = \langle r, s \rangle$ un groupe diédral de type D_n .

a) Montrer que : $G = \{1_G, r, \dots, r^{n-1}\} \cup \{s, sr, \dots, sr^{n-1}\}$ et que G est d'ordre $2n$.

b) Montrer que deux groupes diédraux de type D_n sont isomorphes.

3. Montrer que S_3 est diédral de type D_3 (le groupe du triangle équilatéral).

1. déf : ligne polygonale fermée définie par une suite de points (P_1, \dots, P_n) , telle que tous les côtés $P_i P_{i+1}$ ($1 \leq i \leq n, P_{n+1} = P_1$) et tous les angles en les P_i soient égaux.

Exercice 22 GROUPE DES ISOMÉTRIES DU TÉTRAÈDRE RÉGULIER, APPLICATIONS
 Dans \mathcal{E} espace affine euclidien de dimension 3 on considère un tétraèdre régulier² T et on note G le groupe des isométries qui laissent globalement invariant l'ensemble \mathcal{S} des sommets de T . On pourra *utiliser* G pour traiter les questions géométriques 3. et 5.

1. Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de S_4 .
2. En exhibant des réflexions dans G qui fixent 2 sommets, montrer que G est isomorphe à S_4 . En déduire que le groupe G^+ des *déplacements* qui laissent \mathcal{S} globalement invariant est isomorphe au groupe alterné A_4 .
3. a) Montrer que l'isobarycentre O des quatre sommets de T en est équidistant.
 b) Montrer que les hauteurs de T sont concourantes en O et coupent les faces en leur centre de gravité.
4. Expliciter géométriquement les deux types d'isométries négatives de G .
5. a) Justifier que les paires d'arêtes opposées de T sont orthogonales. Quelle est leur perpendiculaire commune ?
 b) En considérant les produits d'isométries réalisant les doubles transpositions sur \mathcal{S} , montrer que les droites joignant les milieux de deux arêtes opposées de T (les *bimédianes*) sont perpendiculaires deux à deux.

On note \mathcal{B} l'ensemble des bimédianes. On dispose alors d'une version géométrique de l'existence d'un morphisme surjectif de S_4 sur S_3 :

- c) Justifier que G agit sur \mathcal{B} . Montrer que cette action définit un morphisme *surjectif* de $G \simeq S_4$ sur le groupe symétrique $S(\mathcal{B}) \simeq S_3$. Quel est son noyau ?

Exercice 23 LE GROUPE DES ISOMÉTRIES DU CUBE

Soit \mathcal{C} un cube de $E = \mathbb{R}^3$ centré en l'origine. On numérote les sommets d'une face A_1, \dots, A_4 , puis on note B_i le sommet opposé de A_i ($1 \leq i \leq 4$). Les droites $D_i := (A_i B_i)$ sont alors les 4 grandes diagonales du cube. On note G , resp. G^+ , le groupe des isométries de \mathbb{R}^3 (resp. des rotations) qui laissent globalement invariant l'ensemble des sommets de \mathcal{C} ; tout élément de G induit une permutation des 8 sommets de \mathcal{C} , et il fixe leur isobarycentre (0) , c'est donc une isométrie *vectorielle* de \mathbb{R}^3 .

1. Montrer que G agit naturellement sur l'ensemble \mathcal{D} des grandes diagonales de \mathcal{C} . En utilisant la numérotation des D_i , on en déduit un morphisme φ de G dans S_4 .
2. Montrer que $\varphi(-id_E) = id_{S_4}$ et que $\ker \varphi \cap G^+ = \{id_E\}$ (on étudiera la restriction d'un élément g du noyau à chaque grande diagonale, on se ramènera au cas où $g|_{D_1} = id$).

2. T est l'enveloppe convexe de quatre points non coplanaires équidistants les uns des autres, qui sont alors ses sommets.

3. Dans cette question on montre que les transpositions sont dans $\varphi(G^+)$. Sans perte de généralité, on cherche $g \in G^+$ telle que $\varphi(g)$ soit la transposition (12). On note I le milieu de l'arête A_1A_2 , J le milieu de l'arête B_1B_2 et r le retournement (rotation d'angle π) d'axe (IJ) .

Montrer que r est dans G^+ , puis que $\varphi(r) = (12)$.

4. Conclure que la restriction de φ à G^+ est un isomorphisme sur S_4 .

5. Soit X l'ensemble des paires de faces opposées de \mathcal{C} . Montrer que G^+ agit transitivement sur X . En déduire un morphisme surjectif de S_4 dans S_3 dont on explicitera le noyau (cf. exo 22, 5c).

6. Faire la liste des types de rotations de G^+ , en identifiant leur axe et angle, suivant le type de la permutation qu'elles induisent sur \mathcal{D} .

7. Notons G^- l'ensemble des isométries négatives de G . Montrer que G^- est l'ensemble des $-g$, où g parcourt G^+ .

8. En déduire que G est isomorphe à $G^+ \times \{-id_E\}$ et donc à $S_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

9. Reprendre la liste donnée en 6. et donner pour chaque type d'élément g le nombre d'orbites de l'action de $\langle g \rangle$ sur l'ensemble des 6 faces de \mathcal{C} (ceci sert pour dénombrer, à rotation près, les *coloriages* des faces de \mathcal{C} à l'aide d'une palette de q couleurs, voir 13-5).

Exercice 24 Soit G un sous-groupe fini de $GL(E)$, où E est un espace vectoriel euclidien, pour le produit scalaire $b = \langle, \rangle$. On notera $O(E)$ le groupe des isométries de (E, b) .

Pour tous x, y dans E on définit $b'(x, y) = \frac{1}{\text{card}G} \sum_{g \in G} \langle g(x), g(y) \rangle$.

1. Montrer que b' est un produit scalaire sur E et que les éléments de G sont des isométries de l'espace euclidien (E, b') .

2. Soient B, B' des bases orthonormées de E pour les produits scalaires b , resp. b' , et u l'endomorphisme de E dont la matrice dans B est la matrice de passage de B' à B .

Montrer que le conjugué uGu^{-1} de G est inclus dans $O(E)$. En déduire que tout sous-groupe fini de $GL(E)$ (resp. $GL_n(\mathbb{R})$) est conjugué à un sous-groupe de $O(E)$ (resp. $O_n(\mathbb{R})$).

3. Montrer que tout sous-groupe fini de $O(2, \mathbb{R})$ (donc par 2. de $GL(2, \mathbb{R})$) est cyclique ou diédral (cf. exo 21; on s'appuiera sur son intersection avec $SO(2, \mathbb{R})$); noter aussi que *tout* groupe cyclique ou diédral est isomorphe à un sous-groupe de $O(2, \mathbb{R})$.

Groupe affine euclidien

Exercice 25 Dans le plan complexe, on note a, b et c les affixes respectives des points A, B, C , et $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.

Exercice 26 Soit u une isométrie de \mathcal{E} espace affine euclidien de dimension n . On note \vec{u} la partie linéaire de u , et E l'espace vectoriel sous-jacent à \mathcal{E} .

1. Démontrer que $E = \text{Ker}(\vec{u} - id_E) \oplus \text{Im}(\vec{u} - id_E)$. On notera $F = \text{Ker}(\vec{u} - id_E)$.
2. Caractériser les translations t_v de \mathcal{E} qui commutent avec u .
3. Montrer que si u possède un point fixe et $v \in E$, alors $t_v \circ u$ possède un point fixe si et seulement si $v \in F^\perp$.
4. Pour $n = 1$, puis 2 puis 3, quelles sont les isométries de \mathcal{E} qui s'écrivent comme produit de $n + 1$ réflexions orthogonales, et pas de moins ?
5. Pour $n = 3$, trouver la condition pour que deux rotations données de \mathcal{E} d'axes distincts commutent.

Exercice 27 Déterminer le groupe des isométries affines du plan, resp. de l'espace \mathcal{E} de dimension 3, qui conservent globalement la partie X suivante :

- a) l'ensemble $\mathbb{Z} \times \{0\}$ du plan affine euclidien.
- b) une droite donnée de l'espace affine euclidien \mathcal{E} .
- c) la réunion de deux droites non concourantes de l'espace affine euclidien \mathcal{E} .

Pour les exercices 28 à 32 on se donne \mathcal{P} un plan affine euclidien.

Exercice 28 Soit ABC un triangle non aplati de \mathcal{P} . Soit M_0 un point de (AB) . La parallèle à (BC) issue de M_0 coupe (AC) en M_1 . La parallèle à (AB) issue de M_1 coupe (BC) en M_2 etc. On définit ainsi des points M_n (pour $n \geq 0$). Montrer que $M_6 = M_0$.

Exercice 29 Étant donnés deux cercles \mathcal{C} et \mathcal{C}' de \mathcal{P} , de centres O et O' et de rayons inégaux R et R' , combien y a-t-il d'homothéties de \mathcal{P} qui envoient \mathcal{C} sur \mathcal{C}' ? Construire leur centre.

Exercice 30 Étant données r et r' deux rotations de \mathcal{P} de centres respectifs A et B et d'angles respectifs α et β , expliciter la composée $r' \circ r$ (on donnera une construction de ses éléments géométriques).

Exercice 31 Soient A, B, C trois points non alignés de \mathcal{P} . On note r_A (resp. r'_A) la rotation de centre A et d'angle $a = \widehat{BAC}$ (resp. $2a/3$), et on définit de même les rotations r_B et r_C (resp. r'_B et r'_C).

1. On note I le point d'intersection des deux trisectrices intérieures du triangle ABC issues de A et B "proches" du côté AB . Déterminer l'isométrie $r'_A \circ r'_B$.
2. Déterminer les isométries $f = r_C \circ r_B \circ r_A$ et $\tilde{f} = r_A \circ r_B \circ r_C$. Que peut-on dire si le triangle ABC est équilatéral ?
3. Déterminer de même la composée de symétries orthogonales $g = s_{(AB)} \circ s_{(CA)} \circ s_{(BC)}$: montrer que g n'a pas de point fixe et préciser sa décomposition canonique, selon que ABC est ou non rectangle en B .
4. Montrer que $r_A^2 \circ r_B^2 \circ r_C^2 = id_{\mathcal{P}}$ (utiliser les symétries de 3.).

Exercice 32 Dans le plan \mathcal{P} , on considère deux points A et B , situés dans un même demi-plan ouvert de frontière D .

1. Déterminer les points M de la droite D tels que la somme $MA + MB$ soit minimale.
2. Pour un tel point M , que peut-on dire des demi-droites $[MA)$ et $[MB)$?
3. Reprendre la question 1. avec D droite, et A, B deux points de \mathcal{E} euclidien de dimension 3.

Exercice 33 PENTAGONE DE VAN DER WAERDEN

Soient A, B, C, D, E cinq points de \mathcal{E} un espace affine euclidien de dimension 3. On suppose que $AB = BC = CD = DE = EA \neq 0$ et que les angles $\widehat{EAB}, \widehat{ABC}, \widehat{BCD}, \widehat{CDE}$ et \widehat{DEA} sont égaux. L'objectif est de montrer que les cinq points A, B, C, D, E sont coplanaires.

1. Montrer qu'il existe une isométrie f de \mathcal{E} telle que $f(A) = B, f(B) = C, f(C) = D, f(D) = E$ et $f(E) = A$.

On suppose que les cinq points ne sont pas coplanaires.

2. Montrer que $f^5 = id_{\mathcal{E}}$.
3. En déduire que f est une rotation de \mathcal{E} .
4. Conclure. Peut-on étendre ce résultat à d'autres entiers que 5 ?

